

AKTIVÁTOR OXI

je VYSOCE ÚČINNÝ tekutý alginicidní přípravek určený k použití v kombinaci s přípravky OXI TABLETY MAXI, OXI TABLETY MINI, OXI ŠOK a KYSLIKOVÝ GRANULÁT OXI (vše z řady Sparkly POOL). Tento přípravek je NEPEPINIVY, zajistí správou funkci všech přípravků z řady OXI a zabrání VZNIKU VĚTŠÍNE BĚŽNÉ VYSKYTUJUJICÍCH SE RAS v bazénové vodě. Učiní tak vodu ve vašem bazénu jiskrně průzračnou. Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebitelů (TYP PT02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuňte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, pop., respirátor). Zabráňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody oseřetěné tímto přípravkem musí být v souladu s kanonařským delem. PŘÍPRAVEK SE PRÍDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!

1. Před první aplikací přípravku nejprve zkонтrolujte hodnotu pH příslušným **testerem**. - Sparkly POOL, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 – 7,6 pomocí přípravku pH PLUS nebo pH MINUS (např. z řady Sparkly POOL).

2. Přípravek AKTIVÁTOR OXI (z řady Sparkly POOL) se aplikuje vždy po 12 - 24 hodinách od aplikace přípravků z řady Sparkly POOL OXI, které odstraní z vody zbytkový chlór a zabrání tak nežádoucímu zbarvení vody, ke kterému může dojít reakcí na tento zbytkový chlór.

Možnosti aplikace:
A. Poříběné množství přípravku rozdělte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 – 10 l) a rovněž aplikujte (vlevejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.
B. U přelivového bazénu aplikujte poříběné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

C. Automatickým dávkovačem.
APLIKUJTE VŽDY PŘI ZAPNUTEM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalemu promísení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonale promísení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

DAVKOVÁNI: Při dodržení dávkování je přípravek nepěnivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě fáz, nevyzvýšuje dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v krátkých časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému skokovému oseřetění vody přípravek OXI ŠOK (např. z řady Sparkly POOL), který se rychle rozpuští a oxidače nečistoty přitomně ve vodě.

1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI: Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobrě uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobré větráném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOMORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidnými činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušíte expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mydlem. Nepoužívat rozpouštědla ani fedida. Pokud potíže přetrávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vylapovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oči vločka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyměňte je před vylapováním očí, dleto-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrává, vyhledejte odborné lékařské seřízení.

PŘI POZITI:

Vylapujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Neznečistěte stojící nebo tekoucí vody chemikáliemi nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidaci firmě. Za zřídkou odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚCINKNÁ LATKA, KONCENTRACE: Polymer N-Methylmethanamin (EINECS 204-697-4) s (chlorometyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) /Polymerní kvartérní amonné chlorid (PQ Polymer), 22 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNALIZAČNÍ SLOVO:

Varování.
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: Vysoko toxicitní pro vodní organismy. Toxicitní pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal předním oprávněně osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Boží 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3082

DODAVATEL:

ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plzeň
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz



ProChem
SOLUTIONS

www.sparklypool.cz



Obsah:
1l



Sparkly®
POOL

AKTIVÁTOR OXI

PRO AKTIVACI PŘÍPRAVKŮ Z ŘADY OXI
PRO VŠECHNY TYPY BAZÉNŮ

ZAJISTÍ FUNKCI
OXI PŘÍPRAVKŮ

ZAMEZÍ TVORBĚ
ŘAS

NEDRÁZDÍ OČI
ANI POKOŽKU



BAZÉNOVÁ
CHEMIE