

AKTIVÁTOR OXI

je **VYSOCE ÚČINNÝ** tekutý algicidní přípravek určený k použití v kombinaci s přípravky **OXI TABLETY MAXI, OXI TABLETY MINI, OXI ŠOK** a **KYSLIKOVÝ GRANULÁT OXI** (vše z řady **Sparkly POOL**). Tento přípravek je **NEPĚNIVÝ**, zajišťí správnou funkci všech přípravků z řady **OXI** a zabrání **VZNIKU VĚTŠINY BĚŽNÉ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS** v bazénové vodě. Účinně tak vodu ve vašem bazénu jiskrně průzračnou. **Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP PT02).** Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejzte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. **PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVA ZASADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!**

1. Před první aplikací přípravku nejprve zkontrolujte hodnotu pH přibližným **testerem - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH bazénové vody do rozmezí 6,8 - 7,6 pomocí přípravku **pH PLUS** nebo **pH MINUS** (např. z řady **Sparkly POOL**).

2. Přípravek **AKTIVÁTOR OXI** (z řady **Sparkly POOL**) se aplikuje vždy po 12 - 24 hodinách od aplikace přípravku z řady **Sparkly POOL OXI**, které odstraní z vody zbytkový chlor a zabrání tak nežádoucím zbarvení vody, ke kterému může dojít reakcí na tento zbytkový chlor.

Možnosti aplikace:

A. Potřebné množství přípravku rozředíte v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujete (vlévejte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

B. U třípřehledového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

C. Automatickým dávkovačem.

APLIKUJTE VÝDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promíslení přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promíslení je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen. Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

DÁVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepělivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek **OXI ŠOK** (např. z řady **Sparkly POOL**), který se rychle rozpouští a oxiduje nečistoty přítomné ve vodě.

1. Prvotní dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky použijte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chrňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidáčními činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOCI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮJÍ:

Odstřihn timer kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyploachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyploachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstřihn die platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Neznečištěte stojící nebo tekoucí vody chemikálii nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezgenerované roztoky předejte osvědčené likvidací firmě. Za zatřídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiranem (EINECS 203-439-8) /Polymeru kvartérní amonny chlorid (PQ Polymer), 22 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNÁLNÍ SLOVO:

Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod/den).

INFORMACE PRO PŘEPRÁVU:

UN číslo: 3082



DODAVATEL:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz



Obsah:
5 l

www.sparklypool.cz