

ALGICID EXTRA PROTI ŘASÁM PLUS,

je **VYSOCE ÚČINNÝ** tekutý algicidní přípravek určený **K PRAVIDELNÉ PREVENCI VZNIKU A K LIKVIDACI VĚTŠINY BEŽNÉ VYSKYTUJÍCÍCH SE ŘAS** (zelených, černých, žlutých) v bazénové vodě, které jsou schopny přivýknout si i na chlor. **ZAMEZUJE VZNIKU SLEMU VE FILTRAČNÍ JEDNOTCE.** Tento přípravek je **NEPĚNIVÝ, PROCÍŠTUJE VODU V BAZÉNU** a je vhodný k používání společně se všemi ostatními přípravky (chlorovými i bezchlorovými) určenými k dezinfekci bazénové vody.

Biocidní přípravek určený k prodeji spotřebiteli (TYP TP02).

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ:

Při práci s tímto přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte. Používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle, popř. respirátor). Zabraňte úniku do životního prostředí. Vypouštění vody ošetřené tímto přípravkem musí být v souladu s kanalizačním řádem. První dávka se aplikuje po prvním napuštění bazénu na začátku koupací sezóny. Udržovací dávka se aplikuje 1 krát za 7 dnů. **PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSADNĚ DO VODY, NIKDY NE NAOPAK!**

Možnosti aplikace:

A. Potřebné množství přípravku rozedře v plastové nádobě s vodou (o objemu 5 - 10 l) a rovnoměrně aplikujte (vléváte) do vody podél okraje bazénu po celém jeho obvodu.

B. U přelivového bazénu aplikujte potřebné množství přípravku přímo do vyrovnávací nádrže.

C. Automatickým dávkovačem.

APLIKUJTE VŽDY PŘI ZAPNUTÉM FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍ, aby došlo k dokonalému promísání přípravku v bazénu alespoň po dobu 1 hodiny (dokonalé promísání je závislé na výkonu vašeho filtračního zařízení a objemu vody). **Po dobu aplikace přípravku a v následující minimálně 1 hodině nesmí být nikdo v bazénu přítomen.** Přípravek doporučujeme aplikovat večer.

NÁS TIP:

Společně s tímto přípravkem používejte přípravek **VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA** nebo **PROJASNOVAČ EXTRA** (z řady Sparkly POOL), který zbytky zahubených řas pomůže snadněji odfiltrovat filtračním zařízením a také je vyvlókuje na dno bazénu, kde je jednoduše vysajete. Dosáhnete tak průzračné a jiskrné vody ve vašem bazénu.

DAVKOVÁNÍ:

Při dodržení dávkování je přípravek nepěnvivý. Jestliže dojde, a to zejména při vysokých teplotách vody nebo při intenzivním používání bazénu k tvorbě řas, nezvyšujte dávku tohoto přípravku, ale aplikujte udržovací dávku v kratších časových intervalech, popřípadě použijte k jednorázovému šokovému ošetření vody přípravek **CHLOR ŠOK** (např. z řady Sparkly POOL).

1. První dávka: 15 - 20 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu (pro první týden).

2. Udržovací dávka: 5 - 7 ml na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazénu každých 5 - 7 dnů.

Všechny výše uvedené (doporučené) přípravky používejte podle návodu uvedeného na jejich obalech!

SKLADOVÁNÍ A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotřebujte do 24 měsíců od data balení uvedeného na obalu. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném a dobře větraném místě při pokojové teplotě. Skladujte z dosahu: potravin a nápojů, krmiv, nekompatibilních materiálů. Chrňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

ČÍSLO ŠARŽE:

Uvedeno na obalu.

UPOZORNĚNÍ:

Pozor! Nemíchejte a nepoužívejte společně s jinými výrobky, zejména se silnými oxidacími činidly. Přípravek smí být použit pouze k úpravě vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

POPIS PRVNÍ POMOČI:

PŘI VDECHNUTÍ:

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Při přetrvávající nevolnosti zajistěte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Odstranit kontaminovaný oděv, boty a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI STYKU S OKEM:

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vymějte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Pokud bolest nebo zčervenání přetrvává, vyhledejte odborné lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vyhledejte lékařskou pomoc.

LIKVIDACE:

Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). **Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace!** Nečistěte stěny nebo tekoucí vody chemikálií nebo použitou nádobou. Zbytková množství a nezregenerované roztoky předejte osvědčené likvidační firmě.

Za zařídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PŘÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRACE:

Polymer N-Methylmethanaminu (EINECS 204-697-4) s (chloromethyl)oxiránem (EINECS 203-439-8) /Polymerní kvartérní amonný chlorid (PQ Polymer), 28 g/100 g (číslo CAS: 25988-97-0, číslo ES: 607-843-9).

SIGNÁLNÍ SLOVO:

Varování.

STANDARTNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte kůži. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Nečítejte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO:

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402 (24 hod denně).

INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

UN číslo: 3082

UFI:
D300-A06R
D004-G9CM



Obsah:
5 l



DODAVATEL:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 632, 798 03 Plumlov
(+420) 588 002 000, info@prochems.cz
www.prochems.cz

www.sparklypool.cz